

CONSEILS POST-OPERATOIRES

Les points sont résorbables et "tomberont" naturellement entre deux et quatre semaines.

POUR EVITER LES COMPLICATIONS ET ASSURER UNE BONNE CICATRISATION, IL EST RECOMMANDE :

- De suivre scrupuleusement l'ordonnance que l'on vous a prescrite.
- D'éviter impérativement de consommer de l'alcool ou du tabac car cela peut provoquer un retard de cicatrisation.
- De ne pas faire de bain de bouche.
- De ne pas se livrer à une activité physique importante.
- De ne pas forcer l'ouverture de la bouche, de ne pas tirer sur la joue et les lèvres.
- De ne pas explorer la plaie avec la langue ou un objet.

DES VOTRE RETOUR AU DOMICILE :

- Les premières 48 heures, appliquer de la glace à l'extérieur de la bouche, régulièrement.
- Boire un litre d'eau dans la journée.

L'HYGIENE BUCCALE :

- **Ne pas faire de bain de bouche le jour de l'intervention.**
- Brosser les dents et les gencives normalement, excepté à l'endroit de la chirurgie.
- Dans les secteurs traités, effectuer un brossage doux : **brosse INAVA post-opératoire 6.5/100** trempée dans l'Eludril Pur.

L'ALIMENTATION :

- Manger des aliments nourrissants mais mous (œufs, viande hachée, pâtes, purée, fromages et petits pots de bébé).
- Eviter les liquides très chauds, les aliments épicés.
- Utiliser éventuellement des compléments alimentaires (demander conseil à votre pharmacien).
- Eviter de mâcher sur la zone de l'intervention.

EN CAS DE DOULEUR :

- La douleur d'intensité variable peut survenir dès la fin de l'intervention ou être retardée.
- Utiliser les antalgiques prescrits et **ne pas prendre d'aspirine.**

EN CAS DE SAIGNEMENT :

- Un petit saignement peut persister quelques heures surtout si une prothèse provisoire est placée immédiatement.
- Eviter de cracher et d'effectuer des mouvements de succion important ou d'explorer la plaie avec la langue.
- Si le saignement est important, comprimer avec une compresse de gaze froide pendant 30 min.

EN CAS D'OEDEME :

Son importance et sa vitesse d'apparition sont variables. Il peut survenir jusqu'à 2 jours après l'intervention.

VEUILLEZ NOUS CONTACTER AU 04.79.96.85.55 EN CAS DE :

- Très fortes douleurs,
- Fièvre,
- Suppuration,
- Saignement persistant,
- Réouverture de la plaie,
- Manifestation allergique à un médicament,
- Source d'inquiétude quelconque.

APRES LA POSE D'IMPLANT :

Une vis conique est posée à la fin de la chirurgie pour obturer l'implant et permettre la cicatrisation de la gencive. Si celle-ci se dévisse, conservez la et appeler le cabinet immédiatement afin qu'un des praticiens puisse la remettre en place le plus rapidement possible.